外臺秘要方卷第三 天行二十一門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

天行病發汗等方四十二首
天行病方七首 許仁則
天行嘔逆方七首
天行嘔啘方七首
天行喉咽痛方二首
天行衄血方四首
天行口瘡及口乾苦方四首
天行欬嗽方五首
天行發斑方三首
天行發瘡豌豆皰瘡方一十三首
天行虛煩方二首

天行狂語方三首
天行熱毒攻手足方五首
天行大小便不通脹滿澀方四首
天行熱痢及諸痢方四首
天行䘌瘡方八首
天行陰陽易方二首
天行虛羸方二首
天行後禁忌方二首
天行勞復食復方六首
天行差後勞發方五首 許仁則
天行病發汗等方四十二首

病源夫天行時氣病者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫者此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少率多相似者此則時行之氣也從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而人有壯熱為病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非觸冒之過也若三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶小輕也五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦小微也其病與溫及暑病相似但治有殊耳然得時行病一日在皮毛當摩膏火灸愈不解者二日在膚可法鍼服解肌散汗出愈不解三日復發汗若大汗則愈不解者止勿復發汗也四日在胷服藜蘆丸微吐之愈若病固服藜蘆丸不吐者服赤小豆瓜蔕散吐之即愈視病者尚未了了復一法針之當解不愈者六日熱已入胃乃與利湯下之愈百無不如意但當諦視節度與病

耳若食不消病亦與時行病俱發熱頭痛食病當速下之時行
病當待六七日下之時行病始得一日在皮二日在膚三日在
肌四日在胷五日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之則熱
乘虛便入胃然病要當復下去之不得留於胃中也胃若實熱
致此爲病三死一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微
者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一
生但論人有彊弱病有難易攻效相倍耳病者過日不以時下
之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不安精
采言語與人不相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕
水和服之當以新汲冷水令彊飲一升若一升半可至二升益
佳以指刺喉中吐之隨手愈不即吐者此病輩多不善勿彊與
水水停即結心下也更當以餘藥吐之皆令相主當者不爾必
危若此病不急以猪苓散吐解之者其死殆速矣亦可先以去

毒物及法針之尤佳其湯熨鍼石别有正方補養宣導今附
於後
養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽兩耳舉
又引鬢髮即流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱以摩
面從上下二七止去脚氣令面有光又摩手令熱從體上下
名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈
又時氣病一日太陽受病太陽爲三陽之首主於頭項故
得病一日頭項腰脊痛
又時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脉絡鼻入目故
病二日肉熱鼻乾不得眠夫諸陽爲表表始受病皮膚之
間故可摩膏火灸發汗而愈
又時氣病三日少陽受病少陽脉循於脅上於頸耳故得
病三日胷脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於

藏故可汗之而愈

又時氣四日太陰受病太陰爲三陰之首是知三日已後諸陽受病訖即傳之於陰而太陰受病焉其脉主於咽嗌故得病四日腹滿而嗌乾其病在胷膈故可吐而愈也

又云夫得病四日毒在胷膈故宜取吐有得病二三日便止煩滿此爲毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上焦者其人有淡實故也所以復宜取吐也

又時氣病五日少陰受病少陰脉貫腎絡肺繫於舌本故得病五日口熱舌乾渴而引飲其病在腹故可下而愈

又時氣病六日厥陰受病厥陰脉循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此爲三陰三陽俱受病毒氣入於腸胃故可下而愈

又時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病竟故也今病不除者欲爲再經病再經病者謂陰陽諸經重受病也

又時氣病八九日以上不解者或是陰陽諸經重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未即相傳致使停滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之並出第九卷中

廣濟天行壯熱煩悶發汗麻黃湯方

麻黃五兩去節 葛根四兩 梔子二七枚擘 葱切一升

香豉一升綿裹

右五味㕮咀以水八升先煮麻黃葛根三兩沸去沫內諸藥煎取二升五合絞去滓分爲三服服別相去如人行五六里更進一服不利覆取汗後以粉粉身忌風及諸熱食出第一卷中

肘後療天行一二日麻黃解肌湯方

麻黃一兩去節　升麻一兩　甘草一兩炙　芍藥一兩

石膏一兩碎綿裹　杏人三十枚去尖雙人　貝齒三枚末

右七味細切以水三升煮取一升頓服覆取汗汗出則愈便食豉粥補虛也忌海藻菘菜千金同

又方

麻黃二兩　加黃芩　桂心各一兩　生薑三兩

右四味切以水六升煮取二升分三服忌生葱張文仲同

又葛根解肌湯方

葛根四兩　芍藥二兩　麻黃一兩去節　大青一兩

甘草一兩炙　黃芩一兩　石膏一兩碎　大棗四枚擘

桂心一兩

右九味切以水五升煮取二升分溫三服相次服之覆取汗差忌海藻菘菜生葱炙肉等張文仲同

又療二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡八兩　人參三兩　甘草三兩炙　黃芩三兩

生薑三兩　半夏半斤洗　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升分三服微覆取汗半日便差如不除更服一劑忌海藻菘菜羊肉餳范汪張文仲同此張仲景傷寒論方

又若有熱實得汗不解腹脹痛煩躁欲狂語者可服大柴胡湯方

柴胡半斤　大黃二兩　黃芩二兩　芍藥二兩

枳實四枚炙　半夏五兩洗　生薑五兩　大棗十二枚擘

右八味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服當微利忌羊肉餳此方四首最第一急疾須預

有幸可得藥處便不可不營之保無傷死諸小療為以防窮極者耳忌羊肉餳出第二卷中同上

删繁療天行三日外至七日不歇肉熱令人更相染著大青消毒湯方

大青四兩　香豉八合綿裹熬　乾葛　梔子各四兩

生乾地黃一升切　芒消三兩

右六味切以水五升煮諸藥味取二升五合去滓下芒消分三服忌蕪荑熱麪酒蒜等物一方有石膏八兩

又療天行五日不歇未至七日皮肉毒熱四肢疼痛彊苦參吐毒熱湯方

苦參八分　烏梅七枚　雞子三枚取白

右三味以苦酒三升煮二物取一升去滓澄清下雞子白攪調溫去沫分再服之當吐毒熱氣出愈

又療天行七日至二七日藏腑陰陽毒氣天行病欲歇而未歇或因食飲勞復心下脹滿煩熱生地黃湯方

生地黃切一升　黃芩三兩　桂心二兩　甘草二兩炙

竹葉切一升洗　香豉一升綿別裹　蓴心一升　芒消三兩

尖鼠屎三七枚　乾葛一兩　麻黃三兩去節　石膏八兩碎綿裹

右十二味切以水九升煮取三升去滓下芒消分三服忌蕪荑海藻菘菜生葱等

又療天行二七日外至三七日不歇或寒或熱來去噏噏音吸四肢羸瘦飲食不能腹中虛滿熱毒不安生地黃湯方

生地黃汁一升　生麥門冬汁一升　赤蜜一升　人參二兩

白朮三兩　桂心一兩　甘草二兩炙　生地骨皮四兩

升麻三兩　石膏八兩碎綿裹　蓴心一升

右十一味細切以水九升煮諸藥味取二升去滓下地黃汁

更煎三兩沸分溫五服晝四夜一服忌蕪荑生葱海藻菘菜桃李雀肉等物

又療天行二七日至四七日勞痟(烏玄反)不歇熱毒不止乍寒乍熱乍劇乍差發動如瘧鼈甲湯方

鼈甲(三兩炙)　大青(二兩)　石膏(八兩碎綿裹)　牡丹皮(一兩)

烏梅肉(一兩)　常山(三兩)　竹葉(切一升)　牛膝根(三兩)

甘草(一兩)　香豉(一升熬綿裹)

右十味切以水九升煮取三升分溫三服日三忌生葱生菜鯉魚海藻菘菜莧菜蕪荑(一方有生天門冬生地黃各切一升)

千金療天行熱病五六日以上宜服苦參湯方

苦參(三兩)　黃芩(二兩)　生地黃(八兩)

右三味切以水八升煎至二升去滓溫服半升日再忌蕪荑出第九卷中

又凝雪湯療天行毒病七八日熱積胷中煩亂欲死起死搨(音塔)湯方

芫花(一斤)

右一味以水三升煮取一升半漬故布薄胷上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也張文仲備急古今錄驗深師范汪並同出第十卷中

千金翼療天行脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表證續在此當發其汗服藥已微除發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也宜服麻黃湯方(千金翼不療天行)

麻黃(三兩去節)　桂心(二兩)　甘草(一兩炙)　杏人(七十枚去尖皮兩人)

右四味切以水九升先煎麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半分服八合取汗不須飲粥投此湯易得汗忌菘菜海藻生葱深師同出第九卷中(此張仲景傷寒論方)

崔氏療時行數四日而大下熱痢時作白通諸藥多不得止吾思舊方多療傷寒後下痢耳未有尚在數日便兼除熱止下者也四順湯熱白通苦温故吾思作此湯以救數十人兼主傷寒

黃連龍骨湯方

黃連三兩止利除熱　黃蘗三兩止利除熱　熟艾如雞子一枚除熱毒止利　龍骨二兩止利除熱

右四味切以水六升煮取二升半分三服無不斷者忌猪肉冷水

又其年時行四五日大下後或不下皆患心中結滿兩脅痞塞胷中氣急厥逆欲絶心起高胷手不得近不過二三日輙便死殁諸醫用瀉心湯余用大小陷胷湯並不得療重思此或是下後虚逆而氣已不理而毒復上攻毒氣相搏結於胷中縱不下者毒已入胃胃中不通毒還衝上復搏於氣氣毒相激故致此病療之當先理其氣次下諸疾思與增損理中丸方

人參二兩　白朮二兩　甘草二兩炙　乾薑六分炮

加栝樓根二兩　枳實四枚　茯苓二兩　牡蠣二兩熬

右八味末之以蜜和爲丸服如彈一丸熱水下不歇復服余時用此効的神速下喉即折續復與之不過服五六丸胷中豁然矣用藥之速未嘗見此然渴者當加栝樓不渴除之下者當加牡蠣不下勿用余因以告領軍韓康伯右衞毛仲祖光祿王道豫靈臺郎顧君苗著作商仲堪諸人並悉用之咸歎其應速于時枳實乃爲之貴難者曰傷寒熱病理中温藥今不解之以冷而救之以温其可論乎余應之曰夫今詠時行始於項彊刺色次於失眠發熱中於煩躁思水終於生瘡下痢大齊於此耳忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等深師方同

又阮河南療天行七八日熱盛不解艾湯方

苦酒三升　葶藶子二合熬擣　生艾汁取一升無生艾熬艾乾艾亦可用無艾可艾根擣取汁

右三味煎得一升頓服愈若有牛黃內一刀圭尤良此宜療內有大熱也阮河南曰療天行凡除熱解毒無過苦醋之物故多用苦參青葙艾葶藶苦酒烏梅之屬此其要也夫熱盛非苦醋之物則不能愈熱在身中既不時治治之又不用苦酢之藥如救火不以水必不可得脫免也又曰今諸療多用辛甜薑桂人參之屬此皆貴價難得常有此行求之轉以失時而苦參青葙葶藶子艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝於向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按常藥次也便以青葙苦參艾苦酒療之但稍與促其間耳無不解

千金集驗同並出於第一卷中

又茵蔯丸療瘴氣時氣及黃病痟瘧等方

茵蔯二兩　大黃五兩　豉五合熬令香　常山三兩

梔子人二兩　鼈甲二兩炙　芒消二兩　杏人三兩去尖皮熬

巴豆一兩去心皮熬

右九味擣篩蜜和爲丸初得時氣三日內平旦飲服每服一丸丸如梧子大如人行十里久或吐或利或汗如不吐及不利不汗更服一丸五里久不吐利汗則以熱飲投之老小以意量減黃病痰澼時氣傷寒痟瘧小兒驚熱欲發癎服之無不差者療瘴特神驗有人患赤白痢者服之亦差春初有宿熱依上法服之取吐利當年不憂熱病忌莧菜蘆笋野猪肉生葱生菜出第二卷中千金同

張文仲療天行若已五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食大黃湯方

大黃半兩　黃連半兩去毛　黃蘗半兩　梔子半兩擘

右四味切以水八升煑取六七沸内豉一升葱白七莖煑取三升分三服此許推然方神良又療傷寒已五六日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌猪肉冷水小品備急同

又支太醫桃葉湯熏身法

水一石煑桃葉取七升以薦席自圍衣被蓋上安桃湯於牀簀下取熱自熏停少時當雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大搥則愈

又廩丘蒸法

經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法後以問張苗苗云曽有人疲極汗出卧單簟中冷但苦寒捲四日凡八過發汗汗不出苗燒地排葉蒸之則得大汗被中傳粉極燥便差後用此法發汗得出療之備急方同

又療天行熱毒垂死破棺千金湯方

苦參一兩

右一味㕮咀以酒二升半舊方用苦酒煑取半升去滓併服當吐如烊膠便愈神驗肘後同延年治天行四五日結胷滿痛壯熱身痛出第二卷中

延年秘録療天行頭痛壯熱一二日水解散方

麻黄四兩去節　大黄三兩　黄芩三兩　桂心二兩

甘草二兩炙　芍藥二兩

右六味擣篩爲散患者以生熟湯浴訖以煖水和服方寸匕覆取汗或利則便差丁彊人服二方寸匕忌海藻生葱菘菜生菜古今録驗同千金無黄芩芍藥

又梔子湯主天行一二日頭痛壯熱心中熱者方

梔子三兩　黄芩三兩　豉一升熬綿裹　葱白一升切

石膏四兩碎綿裹　乾葛四兩切

右六味切以水七升煮取二升六合去滓分温三服如人行八九里再服忌麪酒生冷等物

又解肌湯主天行病二三日頭痛壯熱者方

乾葛四兩　麻黄三兩去節　芍藥二兩　黄芩二兩

甘草一兩炙　大棗十二枚擘　桂心一兩

右七味切以水八升煮取二升半去滓分三服得汗愈忌海藻菘菜生葱等蔣孝璋處

又療欲似天行四五日熱歇後時來時往惡寒微熱不能食者知母湯方

知母二兩　枳實三兩炙　梔子人三兩　豉一升熬別裹

右四味切以水六升煮取二升半去滓分温三服如人行八里一服忌蒜麪

又療天行五日頭痛壯熱食則嘔者竹茹飲方

竹茹二兩　生薑三兩　黄芩二兩　梔子人二兩

右四味切以水五升煮取一升六合去滓分温三服忌蒜熱麪等五日

又療天行五六日頭痛骨節疼痛腰痛兼痢黄芩湯方

黄芩三兩　梔子人三兩　芍藥三兩　豉一升綿裹

右四味以水六升煮取二升半去滓分三服忌物依前

又柴胡湯天行五六日壯熱骨煩疼兼兩脅連心肋下氣脹急硬痛不能食恐變發黄者方

柴胡三兩　枳實三兩炙　栝樓三兩　黄芩三兩

梔子人三兩　茵蔯三兩　龍膽二兩　大黄三兩切

右八味切以水九升煮取二升七合去滓分温三服忌熱麪蒜並出第九卷中

又竹茹飲主痢後得天行頭痛三四日食即嘔吐者方

竹茹二兩 橘皮二兩 生薑四兩 人參二兩

蘆根一升切 粳米一合

右六味切以水六升煑取二升五合去滓分溫五六服中間任食忌熱麪生冷張文仲處

又療天行熱病七八日成黃面目身體悉黃心滿喘氣麤氣急者茵蔯丸方

茵蔯三兩 大黃五兩 梔子人二兩 黃芩二兩

鼈甲二兩炙 常山二兩 芒消二兩 巴豆一兩去皮心熬

升麻二兩 豉三合熬

右十味擣篩以蜜和為丸如梧子大患者飲服三丸以得吐利則差忌莧菜生葱生菜野猪肉蘆笋出第十卷中

救急療天行熱氣頭痛骨肉酸疼壯熱等疾若初病一日在毛髮二日在皮膚三日在肌肉必未得取利且宜進豉尿湯方

豉一升 葱白一升切 小便三升童子者為佳

右三味先熬豉及葱白令相得則投小便煑取一升澄清及熱頓服或汗或利但差則得如未歇依前更進一劑頻用有効

又如不除進柴胡湯方

麻黃二兩陳者去節 柴胡三兩 黃芩五兩 甘草二兩炙

乾葛三兩 石膏五兩碎綿裹 葱白根切一升勿令有青處青即熱白即冷一作桑根皮

豉七合綿裹三沸出之

右八味切以水九升宿漬藥明旦先煑麻黃令沸掠去上沫然後并諸藥煑取一升七合分三服服別相去三食頃良久覆取汗汗出以粉拭之惡寒多加桂心一兩忌海藻菘菜等

又療天行病不即療經四五日渴引飲心上急強手不得近又不得眠荒亂此則是黃不必得待刺黃始服藥凡是心強氣急不得眠臥服此湯吐即差瓜蔕散方

瓜蒂（按量一合熬令似黃勿令焦） 小豆（一合小弱量）

右二味擣篩爲散凡有病如前候及天行病得四五日不歇皆宜服此方以漿飲五合和散一錢匕服之二食久必吐不吐更與半錢匕服吐畢即差中男以上量意斟酌服之

又天行病若大困患人舌燥如鋸極渴不能服藥者宜服乾糞湯一名破棺湯解大熱方

陳久乾人糞（一大升）

右一味以沸湯一大升沃此糞一食久澄清濾取一升頓服如渴不止者又依前法更服此宜灸從心厭骨向下一寸半名巨闕取患人中指節爲寸灸三十壯若無心厭骨則以中指節前量橫括心上至歧骨上兩頭藥著骨當橫量下以前一寸當中直下則是巨闕也

必効療天行一二日者方

麻黃（一大兩去節）

右一味以水四升煑去沫取二升去滓則著米一匙及豉爲稀粥取強一升先作生熟湯浴淋頭百餘椀然後服前粥則厚覆取汗於夜最佳

又療天行病經七日以上熱勢彌固大便澀秘心腹痞滿食飲不下精神昏亂恍惚狂言浪語脉沈細衆狀之中一無可救宜決計服此鼈甲湯方

鼈甲（二兩炙） 細辛（二兩） 桂心（二兩） 白术（二兩）

生薑（四兩） 吳茱萸（二兩） 白鮮皮（二兩） 附子（一兩半炮）

枳實（二兩炙） 茵蔯（二兩） 大黃（三兩切）

右十一味切以水八升煑取二升六合去滓分三服服別相去如人行五里進一服忌生葱生菜莧菜猪肉桃李雀肉等

又療天行十日以上腹微滿讝語或汗出而不惡寒體重短氣

腹滿而喘不大便繞臍痛大便乍難乍易或見鬼者大承氣湯方

大黃四兩 厚朴半斤炙 陳枳實五枚炙 芒消三合

右四味切先以水一斗煮二味取五升去滓內大黃復煮取二升去滓內芒消煎令三兩沸適寒溫分再服得下者止不下更服之並出第三卷中此張仲景傷寒論方

古今錄驗八毒大黃丸療天行病三四日身熱目赤四肢不舉產乳後傷寒舌黃白狂言妄語亦療溫病已後飛尸遁尸心腹痛膈上下不通癖飲積聚癰腫苦痛溫中摩痛上諸毒病方

藜蘆二分炙 大黃三分 朱砂五分 蜀椒四分

雄黃四分研 巴豆四分去皮熬 桂心四分

右七味擣篩蜜和為丸如麻子大飲服三丸當下不差更服合時勿令婦人雞犬見之忌生葱野猪肉蘆笋狸肉生血物

又牽馬丸療天行病四五日下部生瘡醫所不能療者方

附子一枚炮 藜蘆一兩炙 桂心一兩 巴豆一兩去心皮熬

右四味擣篩研巴豆如膏和散蜜丸如梧桐子空腹服二丸熱在膈上不下飲半升熱飲投吐之後下下部瘡自差神良病家嘗牽馬買藥因名牽馬丸老小半之以意消息之忌野猪肉生葱狸肉蘆笋等物

又療若六七日熱盛心煩狂言見鬼者方

絞人糞汁飲數合服良出第三卷中

近効療天行三日外若忽覺心上妨滿堅硬脚手心熱則變為黃不療殺人秦艽湯方

秦艽一兩 紫草一兩 白鮮皮一兩 黃芩一兩

梔子一兩

右五味切以水一大升半牛乳一大升煮取七合分為二服老小以意量之一劑不愈更與一劑試有効

天行病方七首 此方兼療傷寒爲題云天行所以入天行部

許仁則云此病方家呼爲傷寒有二種有陰有陽陰傷寒者反於陽是也陽傷寒狀表裏相應心熱則口乾苦肝熱則眼赤暈脾熱則穀道稍澀腎熱則耳熱赤肺熱則鼻乾渴胃熱則嘔逆大腸熱則大便祕澀小腸熱則小便赤少皮膚熱則脉洪數身體熱反此者乃陰傷寒夫傷寒者則爲寒所傷也寒主陰陰主殺凡人陰陽調則無病氣既爲寒所傷便致斯疾也

又論陰陽傷寒者則毒氣傷陰陽氣也人身中有陰陽之氣陰陽者則寒熱也本以陰爲毒所傷則不能流行陽熱獨王故天行多熱者也以病於諸病之中最難爲療陰陽二病陰尤可憂耳時聞有此病而多倉卒死者不少或由診候不能精審方藥未達指歸飲食乖宜寒溫失節故致爾自心不全甄別他醫難得精妙與其療也寧可任之但能滋味適寒溫將理中間冷暖守過七日此最爲得計其中事須服藥不可徒然者唯多日大便不通暫須一轉洩耳病經一二日覺身體壯熱頭痛骨肉酸楚背脊強口鼻乾手足微冷小便黃赤此是其候若如是宜先合煑桃柳等三物湯浴之方

桃枝細切五斗　柳葉細切五斗　酢漿水一斗

右藥先以水一石煑桃柳枝葉二物取七斗汁去滓內醋漿水攪帶熱以浴浴訖拭身體令乾以粉摩之勿觸風則於密處刺頭眼後兩邊及舌下血斷以鹽末厭刺處則入被卧

又後服解肌乾葛等五物飲微覆取汗如病根輕者因此或歇方

葛根切五合　葱白切一升　生薑切一合　豉心一升綿裹

粳米二合研碎

右藥切以水五升煑取豉心以上四味取三升半汁去滓內粳米屑煑令米爛帶熱頓啜候盡微覆取汗無所忌

又依前浴等法不覺歇宜更作雞子湯重洩之方

新殼産雞子五枚

各破頭瀉置一盞中別加一雞子水以筯攪令極渾別用水一升煑極沸則投雞子於湯中微攪纔似熟則瀉置椀中内少醬清似變腥氣帶熱啜令盡覆使汗出

又依前雞子湯出汗汗洩當歇如不覺退合梔子等六味散以下之方

梔子三十枚擘　乾葛五兩　茵蔯二兩　蜀升麻三兩

大黃五兩　芒消五兩

右藥切合擣爲散以飲服三方寸匕服之須臾當覺轉則利也如經一兩食頃不利且以熱飲投又不利即斯須更服一方寸匕還以飲投得利爲度後適寒温將息更不須服此也

又依前梔子等六味散取利復不覺退加嘔逆食不下口皐喉

舌乾燥宜合生蘆根八味飲子細細服之方

生蘆根切一升　生麥門冬二升去心　生薑五兩　人參二兩

知母二兩　烏梅十顆　白蜜一合　竹瀝三合

右藥切以水八升煑取三升去滓内蜜瀝等攪令調細細飲不限遍數冷煖亦不限食前後服此飲子雖不能頓除熱病然於諸候不覺有加體氣安穩心腹不冷意又欲得此飲任重合但依前服之如熱勢不退心腹妨滿飲食漸少心上痞結則不可重服之

又依前生蘆根等八味飲子飲之諸狀不歇漸不下食心腹結硬不得手近有時觸著痛不可忍既是熱病體氣合熱骨肉疼痛脉合洪數口合苦爽食合嘔逆體氣反凉脉反沈細飯食反下反不知痛惱大小便祕塞心上如石痛不可近視脣急皐張手眼尋繹狂言妄語此由熱極將息醋冷飲食寢味唯冷是

求熱結在心無因通洩如有此者十不收二三更不可以常途守之當須作成敗計耳此非半夏等十味湯無柰之何其中有諸狀與此無別但加身體黃眼白睛色如黃蘗此是急黃如有亦不可守常法還宜合後湯救之方

半夏五兩熊州者湯洗去滑汁盡疑熊字　乾薑三兩　吴茱萸二兩

桂心二兩　白朮三兩　細辛三兩　柴胡三兩

牡丹皮三兩　大黃五兩　芒消二兩

右藥切以水一斗煑取三升去滓內芒消攪令消盡分溫三服每服如人行十里久若服一服利後須伺候將息勿更進湯藥但研好粟米作汁飲細細與之如覺利傷多可以酢飯止稠酢漿粥亦得忌羊肉餳生葱生菜桃李雀肉胡荽等

又依前成敗計服半夏等十味湯後雖得毒熱勢退利過不休體力漸弱宜合人參等五味散細細服之方

人參五兩　生犀角末二兩　烏梅肉三兩熬　生薑屑三兩

黃連三兩去毛無亦可以龍骨四兩代之

右藥擣篩爲散以飲服一方寸匕日三服稍加至二匕忌猪肉冷水等吴昇同

天行嘔逆方七首

病源胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲水多胃虛冷亦爲嘔也出第九卷中

廣濟療天行惡寒壯熱食則嘔逆前胡湯方

前胡一兩　麥門冬三兩去心　竹茹二兩　橘皮一兩

甘草一兩炙　生薑二兩　生地黃四兩切

右七味切以水七升煑取二升三合絞去滓分溫三服服如人行六七里進一服忌海藻菘菜蕪荑熱麪猪犬肉油膩

出第一卷中

崔氏療天行數日或十許日而表不解心下有水熱毒相搏遂嘔時復有欬者增損阮氏小青龍湯方

麻黃三兩去節　芍藥二兩　桂心一兩　甘草三兩炙　細辛一兩

右五味切以水六升煮取二升溫服七合阮本湯方等分雖未嘗用嫌其大溫余增損其分兩以療十餘人皆愈忌海藻菘菜生葱生菜等出第一卷中

近効療天行壯熱嘔逆不下食橘皮湯方

橘皮三兩　生薑四兩　茯苓三兩

右三味切以水五升煮取一升五合去滓分溫五六服中間任食一日服盡忌大酢蒜麪李雀鵝張文仲等並同出第九卷中

必効療天行嘔吐不下食方

取臘月兔頭并皮毛燒令煙盡擘破作黑灰擣羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令大耗無所忌此用頻効出第一卷中

救急療天行後嘔逆不下食食入則出方

取羊子肝如食法作生淡食不過三兩度則止文仲同

又方

以雞子一枚於沸湯中煮三五沸則出水浸之外熟內熱則吞之神効並出第一卷中無所忌

集驗療天行後氣膈嘔逆不下食生蘆根湯方

燈心一分　生麥門冬十二分去心　人參四分切　生蘆根一大握切

右四味以水一大升煎取八合去滓分溫三服

天行嘔啘方七首

病源伏熱在胃令人胷滿胷滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃

氣虛冷亦令致噦也出第九卷中

肘後療嘔噦不止橘皮甘草湯方

甘草一兩炙　橘皮三兩　升麻半兩　生薑三兩

右四味切以水三升煑取一升盡服之日三四作當止忌海藻菘菜文仲同出第二卷中

文仲近効療嘔逆麥門冬飲子方

麥門冬去心　蘆根　人參各二兩

右三味切以水六升煑取二升七合去滓分温五服徐徐服常用有驗

又方

飲生薑汁三二合大良

又方

枇杷葉去毛煑飲之作粥亦佳出第一卷中

又方

研油麻汁煑菉豆令爛取半升許以手掌大猬皮燒作灰篩之内豆中和食出第二卷中

救急療天行乾嘔若噦手足逆冷薤豉粥方

薤白一升切　香豉一升　白米四合

右三味以水一升煑豉一沸漉去滓下薤及米煑爲稀粥進兩椀良

又療天行後噦欲死兼主傷寒小半夏湯方

半夏五兩洗去滑　生薑八兩切令薄細勿令濕惡經水浸者爲好

右二味各以水三升别煑各取一升半去滓二汁相和一處共煑取二升分三服服相去如人行十里久當令下食其噦不過俄頃則近二公及任理居中屬纊得之明奉御來彖執秘此方但止者藥送來彖與方郎中隣居後乃方便得之大

良効忌羊肉餳傷寒論同並出在第一卷中

天行喉咽痛方二首

病源陰陽隔絶邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於喉咽故痛或生瘡也出第九卷中

深師療天行毒病或下不止喉咽痛黄連馬通湯方

小豆一升　黄連一兩去毛　馬通汁三升　吴茱萸一兩

右四味以馬通汁令煮取一升盡服不差復作有効忌猪肉冷水出第十四卷中

古今録驗青木香湯療春夏忽喉咽痛而腫兼下痢方

青木香二兩　黄連一兩去毛　白頭翁二兩

右三味切以水五升煮取一升半分温三服小兒若服之一服一合忌猪肉冷水出第三卷中

天行衂血方四首

病源天行衂血者五藏熱結所爲心主於血邪熱中於手少陰之經客於足陽明之絡故衂血衂者血從鼻出也出第九卷中

深師療天行毒病鼻衂是熱毒血下數升者方

勿療自差亦無所苦亦可取好松煙墨擣之以雞子白和丸丸如梧桐子大水下一服十丸並無所忌

又黄土湯療鼻衂去五藏熱氣結所爲或吐血者方

當歸　甘草炙　芍藥　黄芩

芎藭各三兩　桂心一兩　生地黄一斤　釜月下焦黄土如雞子一枚碎綿裹

青竹皮五兩

右九味切以水一斗三升煮竹皮減三升去滓内諸藥煮取三升分四服忌海藻菘菜生葱

又方

黄芩四兩

右一味切以水五升煑取二升分三服亦療婦人漏下血

又療脉浮大鼻中燥如此必去血鼻衂方

灸兩臂中脉取止取臂脉法以鼻嗅臂點其鼻所著

處是穴兩臂皆爾出第十四卷中

天行口瘡及口乾苦方四首

病源發汗下後表裏俱虛而毒氣未盡熏於上焦故喉口生瘡

也出第九卷中

深師療天行熱盛口中生瘡酪酥煎丸

酪酥三合　蜜三合　大青一兩

右三味合煎三沸稍稍傅口以差爲度

又口瘡方

取蛇莓五升擣絞取汁稍稍飲之並出第十四卷中

集驗療天行熱病口瘡升麻湯方

升麻二兩　通草四兩　射干二兩　羚羊角三兩屑

芍藥三兩　生蘆根切一升

右六味切以水七升煑取三升分爲三服如人行五里更服

古今錄驗同

又療天行熱病口苦下氣除熱喉中鳴石膏蜜煎方

石膏半斤碎　蜜一升

右二味以水三升煑石膏取二升乃內蜜復煎取一升去滓

含如棗核許盡更含千金同並出第二卷中

天行欬嗽方五首

病源熱邪氣客於肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘

於肺故上氣而欬也出第九卷中

廣濟療天行壯熱欬嗽頭痛心悶前胡湯方

前胡　升麻各八分　貝母　紫菀各六分

石膏十二分碎綿裹　麥門冬八分去心　杏人三十枚去尖皮兩人　竹葉切一升

甘草二分炙

右九味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服相去如人行六七里進一服不吐利差忌海藻菘菜油膩猪魚等

又療天行肺熱欬嗽喉有瘡地黃湯方

生地黃切一升　升麻　玄參　芍藥

柴胡　麥門冬去心各八分　貝母六分　竹葉切一升　白蜜一合

右九味切以水九升煮取三升絞去滓內蜜再上火煎三沸含咽其汁勿停中間不妨食不利忌蕪荑熱麪猪犬肉油膩

又療天行後乍寒乍熱昏昏不省覺脅下痛百節骨痛欬不能下食兼口舌乾生瘡柴胡湯方

柴胡八分　升麻六分　芍藥六分　黃芩六分

甘草五分　石膏十二分碎綿裹　生麥門冬六分去心　葱白十分

香豉六合綿裹　生薑六分　竹葉切一升洗

右十一味切以水九升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服不吐不利差忌海藻菘菜熱麪油膩並出第一卷中

集驗療天行病上氣欬嗽多唾黏涎日夜不定生薑煎方

生薑三兩去皮切如豆粒大

右一味以餳半斤和微煎令爛每日無問早晚少少含仍嚥薑滓一時嚥之

必效療天行病後因食酒麪肺中熱擁遂成欬不止方

桑白皮十二分　桔梗十分　肥乾棗二十一枚擘　麻黃六分去節

曹州葶藶子十分熬令紫色令爲膏湯成下

右五味切先以水四升煮桑白皮等四味可取一升半去滓下葶藶子膏更煎三五沸去滓分溫五服空心食後服或

利勿怪忌猪肉油膩生冷果子等物

天行發斑方三首

病源夫熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬語此爲表虛裏實熱氣燥於外故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開洩更增斑爛表虛故也出第九卷中

肘後比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療劇者數日必死療得差後瘡瘢紫黯彌歲方滅此惡毒之氣也世人云以建武中於南陽擊虜所得仍呼爲虜瘡諸醫參詳作療用之有效方

取好蜜通身摩瘡上亦以蜜煎升麻數數拭之亦佳

又方

以水濃煮升麻漬綿洗之苦酒漬煮彌佳但燥痛難忍也並出第二卷中

文仲陶氏云天行發斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣方云永徽四年比瘡從西域東流于海內但煮葵菜葉蒜虀啖之則止鮮羊血入口亦止初患急食之少飯下菜亦得出第二卷中

天行發瘡豌豆皰瘡方一十二首

病源夫表虛裏實熱毒內盛攻於藏腑餘氣流於肌肉遂於皮膚毛孔之中結成此瘡重者匝遍其身狀如火瘡若根赤頭白則毒輕若色紫黑則毒重其瘡形如豌豆亦名豌豆瘡脉洪數者是其候也出第九卷中

千金療人及六畜天行熱氣病豌豆瘡方

濃煮黍穰汁洗之若是穄穰則不差瘡若黑者擣蒜封之又煮乾芸薹汁洗之

又方　真波斯青黛大如棗水服之差

又熱病後發豌豆瘡方

黃連三兩去毛水二升煑取八合頓服之忌猪肉冷水

又若赤黑發如疥大者方

煎羊脂摩傅之

又方

青木香二兩水三升煑取一升頓服之効

又方 小豆屑和雞子白傅之

又方 以月布拭之

又療豌豆瘡初發覺欲作者方

煑大黃五兩服之延年同

又療瘡出煩疼者木香湯方

青木香二兩 丁香一兩 薰陸香一兩 白礬一兩

麝香二分

右五味以水四升煑取一升半分再服熱盛者加一兩生犀角如無犀角以升麻代之如病輕去礬石大神効

又方

瘡上以芒消和猪膽塗勿動痂落無瘢仍卧黃土末上良此病小便澀有血者中壞瘡皆黑黶不出膿死不療

又內發瘡盛方

醋四合大猪膽一具

右二味煎三沸一服一合日五服良驗並出第十卷中

延年療天行壯熱頭痛發瘡如豌豆遍身大青湯方

大青三兩 梔子二七枚擘 犀角一兩屑 豉五合

右四味切以水五升煑取二升分三服之無所忌

古今録驗水解散療天行熱氣則生疱瘡疼痛解肌出汗

方[出翟世平]

麻黃[一兩去節]　黃芩[二分]　芍藥[二分]　桂心[二分]

右四味擣篩煖水解服二方寸匕覆令出汗日再服差者減之忌海藻菘菜生葱延年同出第二卷中[一方有大黃三分甘草二分]

天行虛煩方二首

病源夫天行病陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心腑而煩者則令人悶而欲嘔若其人胃内有燥糞而煩者則譫語時繞臍痛腹滿皆當察其證候也出第九卷中

文仲療天行表裏虛煩不可攻者但當與竹葉湯方

竹葉[二把]　石膏[碎綿裹一升]　麥門冬[去心一升]　半夏[半升洗]

人參　甘草[各二兩]

右六味切以水一斗煑取六升去滓内粳米一升煑米熟去之分五服嘔者與橘皮湯湯方在上嘔啘篇中不愈者重作此

宫泰數用甚効若傷寒後虛煩亦宜服此方是仲景方忌羊肉海藻菘菜餳

又療虛煩不可方

青竹茹[二升]

右一味以水四升煎至三升去滓分溫五服徐徐服之

天行狂語方三首

病源夫病熱盛則弃衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽氣爭而外并於陽四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高而歌熱盛於身故弃衣而走陽盛故妄言罵詈不避親踈大熱遍身狂言而妄見妄聞也出第九卷中

千金水道散療天行病煩熱如火狂言妄語欲走方

白芷[一兩]　甘遂[二兩熬]

右二味擣篩以水服方寸匕須史令病人飲冷水腹滿則吐之小便當赤也一名濯腹湯此方療大急者出第十卷中文仲范汪同

又五苓散主天行熱病但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當方

猪苓三分　白术三分　澤瀉五分　茯苓三分

桂心二分

右五味擣篩爲散水服方寸匕日三服多煖水汗出愈忌大醋生葱桃李雀肉等張仲景論深師同出第九卷中

古今録驗療天行壯熱狂言謬語五六日者方

雞子三枚　芒消方寸匕　井花水一杯

右三味合攪盡服之心煩下則愈出第三卷中

天行熱毒攻手足方五首

病源熱毒氣從藏腑中出攻於手足手足則焮熱赤腫疼痛也人五藏六腑井滎輸皆出於手足指故此毒從内而出攻於手足也出第九卷中

肘後療天行病毒熱攻手足疼痛赤腫欲脱方

鹽豉及羊肉一斤以來

右三味以水一斗煮肉熟以汁看冷煖漬手足日三度差范汪同

又方

細剉黄蘗五斤許以水三斗煮漬之必効亦治攻陰腫

又方

作坈令深三尺大小容兩足燒坈中令熱以酒灌坎中著屐踞坈上衣壅勿令氣泄日再作之

又方

煮羊桃葉汁漬之加少鹽尤好並出第二卷中

崔氏療天行熱毒攻手足方

猪蹄一具去毛剉碎合葱白一握切以水一斗煮熟去滓內少鹽以漬之肘後同出第一卷中

天行大小便不通脹滿及澀方四首

病源天行大小便不通此由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃乾燥結熱在內故大便不通又汗後津液虛少其人小腸有伏熱故小便不通出第九卷中

廣濟療天行熱氣惡寒頭痛壯熱大小便澀柴胡散方

柴胡八分　茵蔯十分　青木香十分　黄芩八分

土瓜根十分　白鮮皮八分　梔子人十分擘　大黄二十四分

芒消十二分

右九味擣爲散平辰空肚以新汲水服五六錢匕少時當一兩行微利利後煮葱豉稀粥食之熱如未歇明辰更服四錢匕熱歇停藥忌熱食猪犬肉油膩等

又療天行惡寒壯熱頭痛大小便赤澀不下食飲柴胡湯方

柴胡七分　茵蔯七分　大黄十二分別漬　升麻七分

梔子四枚擘　芒消四分湯成下　芍藥七分　黄芩十二分

右八味切以水四升先漬藥少時猛火煮取一升五合分溫三服服別相去如人行六七里喫一服以快利爲度第二服則利更不須服之忌熱食炙肉蒜粘食並出第一卷中

近効主天行後兩脅脹滿方

熬鹽熨之如小便澀亦用鹽熨臍下如水腫以穀枝汁服愈大効

集驗療天行病腹脹滿大小便不通滑石湯方

滑石十四分研　葶藶子一合紙上熬令紫色擣　大黄二分切

右三味以水一大升煎取四合頓服兼擣葱傳小腹乾即易之効肘後崔氏同無大黄

天行熱痢及諸痢方四首

病源此由熱氣在腸胃挾毒則下黄赤汁也又熱毒傷於腸胃故下濃血如魚腦或爛肉汁壯熱而腹絞痛此温毒熱氣所爲也並出第九卷中

深師療天行毒病酷熱下痢七物升麻湯方

升麻　當歸　黄連去毛　甘草炙

芍藥　桂心　黄蘗各半兩

右藥切以水三升煮取一升頓服之忌海藻菘菜猪肉冷水生葱等物

又天行諸下悉主黄連湯方之

黄連三兩去毛　黄蘗二兩　當歸二兩

右三味以水六升煮取三升去滓内蜜一合微火煎取二升半分三服良驗忌猪肉冷水並出第十四卷中一方有龍骨一兩

范汪療天行熱毒下痢赤白久下膿血及下部毒氣當下細蟲如布絲縷大或長四五寸黒頭鋭尾麝香丸方

麝香一分　附子二分炮　雄黄　丹砂

乾薑各二分

右五味各擣下篩訖復更合治之蜜和爲丸如小豆大飲下一丸老小半之効驗忌猪肉生血物等出第三十三卷中

甲乙方療天行熱病差後痢膿血不止方

龍骨一兩

右一味擣研爲末米飲下一錢不計時節日三服佳

天行䘌瘡方八首

病源毒熱結在腹内穀氣衰毒氣盛三蟲動作食人五藏多令

泄痢下部瘡痒若下脣內生瘡但欲寐者此蟲食下部也重者
肚爛見五藏出第九卷中
深師療天行下部瘡爛方
烏梅二七枚去核　大蒜二七枚　屋塵半升篩取細者
右三味擣篩爲散苦酒一升和調於銅器中煎成丸作長挺
內下部范汪同出第十四卷中
范汪療人下部中痒方
蒸棗取膏以水銀熟研丸之令相得長二三寸以綿
薄裹內大孔中蟲出差
又療穀道中瘡方
以水中荇葉細擣綿裹內下部日三肘後同
又療天行䘌蟲食下部生瘡雄黃兌散方
雄黃半兩　青葙子三兩　苦參　黃連各三兩

桃人一兩半去皮尖及兩人熬
右五味合擣篩綿裹如半棗核大內下部亦可米汁服方寸
匕日三服忌猪肉冷水及熱麪炙肉蒜等物
又桂枝湯療天行䘌病方
桂心二兩　小藍二兩
右二味㕮咀以水一斗煑取二升半內猪肝十兩去上膜細研
著湯中和令相得臨時小溫若毒悉在腹內盡服之在下
部者三分藥中用一分竹筒內下部中服藥一時間當下細蟲
如髮大五六升小兒半作之忌生葱並出第三十三卷中
文仲姚氏療天行䘌下部生瘡方
濃煑桃皮煎如糖以綿合導下部中若口中生瘡含之
肘後范汪同出第二卷中
甲乙方療天行病有䘌蟲蝕下部生瘡青葙子散方

未

青葙子一兩　雚蘆二兩　狼牙一兩　橘皮一兩

苦參三兩

右五味擣篩爲散米飲和服方寸匕日三服未差更服以差爲度

又療天行痢膿血下部生䘌蟲黃連丸方

黃連三兩末生用　臘一兩　烏梅肉三兩熬末

右三味鎔臘和蜜爲丸如梧子大空心米飲下三十丸再服加至四十丸差忌猪肉冷水

天行陰陽易方二首

病源天行陰陽易病者是男子婦人天行病新差未平復而與交接得病者名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病者名爲陽易其婦人新病差未平復男子與之交接得病者名爲陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒疫著於人如換易也其病狀身體熱衝胷頭重不能舉眼中生眵四肢拘急小腹絞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不欲舉百節解離經脉緩弱血氣虛骨髓竭便嘘嘘吸吸氣力轉少著牀不能揺動起止仰人或歳月方死出第九卷中

深師療丈夫得婦人陰易之病若兩房室及諸虛勞少腹堅絞痛陰縮困篤欲死方

灸陰頭一百壯便差可至三百壯皆愈良無此後生子如故無妨范汪同無所忌

又療陰陽易病方

取豚卵二枚温令熱酒吞之則差出第十四卷中

天行虛羸方二首

病源夫人榮衛先虛復爲邪熱所中發汗吐下之後經絡損傷陰

陽竭絕虛邪始散真氣尚少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生衆病焉出第九卷中

崔氏療煩躁而渴不止惡寒但熱盛者竹葉湯常用亦佳不徒療天行凡虛羸久病及瘧後胷上淡熱者服之皆妙方

甘草二兩炙　棗十五枚擘　半夏一兩洗　芍藥三兩

前胡一兩　黄芩一兩　小麥五合　人參二兩

粳米一升　知母二兩　麥門冬四合去心　栝樓一兩

生薑四兩　竹葉一把須以竹篠飲代水煑湯不用其葉

右十四味切以竹篠飲一斗五升煑取五升分五服若非天行而虛羸久病胷上痰熱亦可服之加黄耆二兩除黄芩減知母一兩除栝樓用之大効忌羊肉海藻菘菜餳出第一卷中

千金補虛大病後不足萬病虛勞同此方

取五歲以上七歲以下黄牛新生者乳一升以水四升煎取一升如人肌稍稍飲之不得過多十日不佳服佳出第十卷中

天行差後禁忌方二首

集驗云凡熱病新差及大病之後食猪肉及腸血肥魚油膩等必大下痢醫不能療也必至於死若食餅餌粢黍飴脯膾炙棗栗諸果及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃中虛冷大利難禁不下必死下之復危皆難救也熱病之後多坐此死不可不慎也病新差但得食糜粥寧可少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁兎雉鹿肉慎不可食猪犬肉也新差後當靜卧慎勿令人梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞凡此皆令勞復故督郵顧子獻得病已差未健詣華旉視脉旉曰雖差尚虛未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內即死

臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交
接中間三日發病舌出數寸而死病新差未經百日氣未平復
而以房室者略無不死者蓋正疾愈後六十日已能行射獵以
房室則吐涎而死及熱病房室名爲陰陽易之病皆難療多死
近者有士大夫小得傷寒發汗已十餘日能乘馬行來自謂平
復故以房室則小腹急痛手足拘拳而死出第二卷中千金同

深師說天行病未復殭食黃花菜手足稍重一方云青花天行病差食鮰鱠必變成瘕又食鱯魚肉結氣不化天行病差飲酒合陰陽復必死天行病損未滿三月日食鯔鮰肉則復下血食鹽豉令人四枚不舉天行病差食諸菜有花者三年肌膚不充天行病未好損食生瓜芥三月流腫也天行病差食菜合陰陽復必死出第十四卷中千金天行病差後未滿五日食一切肉麪者病更發困天行病差食芥鱠作疽天行病差新起飲酒及食薤菜病更發天行病新差食生魚作下痢必不止天行病差食生菜顏色絕身不平復天行病新汗解飲冷水者損心包令人虛不復天行病未損食犬肉并葫以合食之復則死天行病差食生棗及羊肉者膈上作熱蒸天行新差食犬肉羊肉作骨中蒸熱天行病差食魚肉并瓜生菜食者令人身腫天行病差食蒜膾者病發大困出第十卷中

天行勞復食復方六首

病源夫病新差血氣尚虛津液未復因即勞動更成病焉若言語思慮則勞傷於神梳頭澡洗則勞於力未堪勞而強勞之則生熱熱氣既還入經絡復爲病者名曰勞復又病新差脾胃尚虛穀氣未復若食肥肉魚膾餅棗栗之屬則未能消化停積在於腸胃使脹滿結實因更發熱復爲病者名曰食復並出第九卷中

廣濟療患天行熱氣差後勞發頭痛如初病者鼠矢湯方

雄鼠屎三七枚熬末湯成下　乾葛二兩　梔子十四枚擘　葱白一升

豉八合

右五味切以水三升煑取一升七合去滓內鼠屎末分温二服服別相去如人行六七里微汗內消不利忌如藥法

又療患數日復勞發者枳實湯方

枳實三枚炙　梔子十四枚擘　葱白一升切　香豉半升

鼠屎二七枚

右五味以水一斗煎取二升五合分温三服服別相去如人行六七里進一服內消不利忌如藥法並出第一卷中

深師竹葉湯療天行後虛熱牽勞不腹四肢沉重或一卧一起氣力吸吸羸弱方

竹葉一把　小麥一升　甘草一兩炙　石膏二兩碎

茯苓二兩　半夏一升洗去滑　前胡二兩　知母二兩

黃芩二兩　人參二兩　生薑四兩　大棗三十枚擘

右十二味以水一斗二升煮竹葉小麥減四升去滓內藥煮取三升分三服忌海藻菘菜醋物羊肉餳等物

備急療勞復方

以粉三升以煖飲和服厚覆取汗又以水和胡粉少許服之亦佳出第一卷中

延年葛根飲主熱病勞復身體痛天行壯熱煩悶葛根湯方

葛根一兩　葱白一握　豉半升　米一合

右四味先切葛根以水九升煮取七升則內葱白更煮取四升去葛及葱滓訖則內豉及少許米煮取三沸並濾去米等滓分四服當有汗出即差明旦又更作服忌豬肉蒜等並出第九卷中

必效療天行勞復鼠矢湯方

雄鼠屎五枚兩頭尖者　豉一升　梔子二十枚擘　枳實三枚中破炙令黃

右四味以水五升煮取二升四合分四服相去十里久若覺大便澀加大黃二兩出第一卷中

天行差後勞發方五首

許仁則云此病復發不要起動勞役或因飲食稍多或因言語過分或緣視聽不節或爲動轉不常皆成此復若復甚者乃至不救劇於初得病時不可以復發而生輕易勞復狀一如傷寒初有如此者宜合葱白等七味飲服之漸覆取汗方

葱白連鬚切一升　乾葛切六合　新豉一合綿裹　生薑切二合

生麥門冬去心六合　乾地黃六合　勞水八升此水以杓揚之一千過

右藥用勞水煎之三分減二去滓分溫三服相去行八九里如覺欲汗漸漸覆之兼主傷寒忌蕪荑

又依前葱白等七味飲服之得可但適寒溫將息以取安穩若不覺可宜合萎蕤等五味飲子服之方

萎蕤切五兩　葱白切一升　豉心一升綿裹　粳米三合研碎

雄鼠屎七枚末之

右藥以水七升先煑豉以上取四升汁去滓內粳米屑煑米爛訖內鼠屎末攪調頓服覆被安臥取汗差

又凡天行病差後準常合漸健能行履遂過限不堪起動體氣虛羸每覺頭痛脣口乾乍寒乍熱發作有時或雖能行動運轉然每作時節有前狀者名天行後不了了有此宜合地骨白皮等五味飲子白薇等十味丸方細細服之

地骨白皮三兩　知母三兩　麥門冬去心五兩　竹瀝一升

白蜜三合

右藥切知母以上和麥門冬然後以水六升煑取二升去滓內竹瀝蜜攪調分溫三服服相去如人行十里久如覺虛不能空服頓盡欲間食服亦佳兼主傷寒

又若服前地骨白皮等五味飲子不可雖可不能全退宜合白薇等十味丸方

白薇三兩　知母四兩　地骨皮三兩　乾地黃六兩

麥門冬五兩去心 甘草四兩炙 蜀漆三兩 萎蕤三兩

橘皮二兩 人參三兩

右藥細切合擣篩緗羅爲散蜜和丸如梧桐子大初服以飲下十五丸日再服稍加至三十丸服經三數日後自候腹中若覺熱則食前服如不能以空飲下藥宜合烏梅等四味飲下前丸忌菘菜海藻蕪荑等

烏梅飲方

烏梅十枚 萎蕤五兩 生薑五兩 白蜜一合

右藥切以水六升煮三味取二升去滓內白蜜攪調細細用下前丸多少冷煖以意斟酌縱不下丸但覺口乾渴則飲之

吳昇同

外臺祕要方卷第三 右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子壽校勘

外臺秘要方卷第四 温病及黄疸二十門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

温病論病源一十首

辟温方二十首

斷温令不相涤方二首

温病噦方四首

温病渇方二首

温病發斑方七首

温病勞復方四首

諸黄方一十三首

急黄方六首

黄疸方一十三首

黄疸遍身方一十一首

癊黃方三首

黃疸小便不利及腹滿喘方二首

黃汗方三首

女勞疸方四首

黑疸方三首

酒疸方七首

穀疸方三首

許仁則療諸黃方七首

雜黃疸方三首

溫病論病源一十首

病源經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃爲傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣中而即病者名爲傷寒不即病者其寒毒藏於肌膚中至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極又重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒寒氣之所致（以上與傷寒論同）

凡病傷寒而成溫病者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑故曰冬三月早卧晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪又因於寒欲如運樞故冬傷於寒春必病溫也又有冬時傷非節之暖名爲冬溫之毒與傷寒大異也有病溫者乃天行之病耳其冬月溫暖之時人感乖候之氣未即發病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛也經曰虛邪賊風避之有時恬淡虛無眞氣從之精神內守病安從來故曰人清淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害又云四時陰陽者萬物之根

本也是以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根也從陰陽則生
逆之則死故曰精者身之本藏於精者春不病温也有病温汗
出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂言不能食病名爲何曰病名
陰陽交交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交
爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而
不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝
也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也汗出而脉
尚躁盛者死今脉不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言
者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死凡膚熱其
脉盛躁者病温也其脉盛而滑者汗且出也凡温病人三二日
身軀熱脉疾頭痛食飲如故脉直疾八日死四五日頭痛脉疾
喜吐脉來細十二日死此病不療八九日脉不疾身不痛目不赤
色不變而反利脉來牒牒按不彈手指時時大心下硬十七日死

病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不療也
下利腹中痛甚者死不療也其鍼石湯熨別有正方存神攘辟
今附于後養生方導引法云常以雞鳴時心存念四海神名三
遍辟百邪止鬼令人不病温
東海神名阿明　南海神名祝融　西海神名巨乘
北海神名禺強
又存念心中氣赤肝氣青肺氣白脾氣黃腎氣黑出周其身又
兼辟邪鬼欲辟衆邪百鬼常存心爲炎火如斗煌煌光明則百
邪不敢干之可以入温疫之中
又温病一日太陽受病諸陽主表表謂皮膚也病在皮膚之間
故頭項腰脊痛
又温病二日陽明受病在於肌肉故肉熱鼻乾不得卧故可摩
膏火灸發汗而愈

又温病三日少陽受病其脉循脅絡於耳故胷脅痛而耳聾三陽始傳病訖未入於藏故可發汗而愈也

又温病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於陰故毒氣入胷膈之内其病咽乾腹滿故可吐温病大法四日病在胷膈當吐之愈有得一日至二日便心胷煩滿爲毒已入兼有痰實亦宜吐之

又温病五日少陰受病毒氣入腹其病口熱舌乾引飲故可下之而愈也

又温病六日厥陰受病毒氣入腸胃其病煩滿其陰縮故可下而愈

又温病七日法當愈此是三陰三陽傳病終故也今七日病不除者欲作再經病也再經病者經絡重受於病

又温病八日以上不解者或是諸經絡重受於病或經發汗吐下之後毒氣未盡所以病證不罷也

又温病九日以上病不除者或初一經受病則不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於三陰所以致停滯累日病證不罷皆由毒氣未盡表裏受邪經絡損傷腑藏俱病也並出第十卷中

辟温方二十首

廣濟療疫氣令人不染温病及傷寒歳旦屠蘇酒方

大黄十五銖 白朮十銖 桔梗十五銖 蜀椒十五銖汗

烏頭三銖炮 菝葜六銖 桂心十五銖

右七味㕮咀絳囊盛以十二月晦日日中懸沉井中令至泥正月朔日平曉出藥置酒中屠蘇之東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無恙一家飲一里無恙飲藥酒三朝還置井中若能仍歳飲可代代無病當家内外井皆悉著藥辟温氣也忌猪肉生葱桃李雀肉等經心録同

千金延年有防風十二銖

又辟温氣太一流金散方

雄黃三兩研　礬石一兩半燒令汁盡　鬼箭羽一兩　雌黃二兩研入

羖羊角二兩炙屑

右五味擣篩爲散三角絳囊盛一兩帶心前并門户上若逢大疫之年月初日青布裹一刀圭中庭燒之温病人亦燒熏之肘後千金并翼延年集驗同並出第一卷中

范汪療天氣不和疾疫流行豫備一物柏枝散方

南向社中柏東南枝暴之令乾擣散酒服方寸匕神良肘後千金同出第十二卷中

刪繁辟温病粉身散常用方

芎藭四兩　藁本四分　遠志四分　白朮四分

米粉一斗研入

右五味擣篩爲散和米粉粉身若欲多時加藥增粉用之一劑法如此出第十卷中

千金辟温虎頭殺鬼丸方

虎頭骨五兩炙　朱砂一兩半研　鬼臼一兩　雄黃一兩半研

皂莢一兩炙　雌黃一兩半研　蕪荑一兩

右七味擣篩以臘蜜和如彈丸大絳囊盛繫臂男左女右家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生血物肘後同

又治瘴氣竹茹湯方

青竹茹二升

右一味以水四升煮取三升分三服

又辟温病粉身散方

芎藭　白芷　藁本

右三味等分下篩內米粉中以粉塗身延年同

又斷温疫朱蜜丸方

白蜜和上上朱砂粉一兩常以太歲日平旦大小勿食向東方立人吞三七丸如麻子大勿令齒近之幷吞赤小豆七枚投井泉水中終身勿忘此法

又治温病不相染方

正旦吞麻子赤小豆各二七枚又以二七枚投井中

肘後延年同

又方

新布盛大豆一斗内井中一宿出服七枚肘後用小豆

又方

切松葉如粟米酒服方寸匕日三服辟五年温

又方

常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二七枚

又方

常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆七枚

又方

神仙教子立春後有庚子日温蕪菁菹汁合家大小並服不限多少

又療温氣蒜豉湯方

蒜五十子幷皮研之　豉心一升

右二味以三歲小兒小便二升合煮五六沸頓服並出第九卷中

千金翼老君神明白散方

白术二兩　桔梗一兩　細辛一兩　附子二兩炮

烏頭四兩去黑皮

右五味擣麤篩絳囊盛帶之所居閭里皆無病若有得疫癘

者温酒服一方寸匕覆取汗得吐則差若經三四日者以三
寸匕内五升水中煮令大沸分三服忌猪肉生菜桃李雀肉等

又度瘴散方

麻黄（去節）　升麻　附子（炮）　白朮（各一兩）
細辛　防巳　乾薑　桂心
防風　烏頭（炮）　蜀椒（汗）　桔梗（各二分）

右十二味擣篩爲末密封貯之山中所在有瘴氣之處旦空
腹服一錢匕覆取汗病重稍加之忌猪肉生葱生菜桃李雀肉
等並出第十卷中

古今録驗許季山所撰干敷散主辟温疫疾惡令不相染著氣
方（肘後作敷干抱朴子作敷干）

附子（一枚一分者炮）　細辛（一分）　乾薑（一分）　麻子（一分研）
柏實（一分）

右五味擣篩爲散正旦舉家以井華水各服方寸匕服藥一
日十年不病二日二十年不病三日三十年不病受師法但
應三日服歲多病三日一服之忌猪肉生菜肘後胡洽延年
范汪刪繁同出第二卷中

又殺鬼丸去惡毒方

雄黄（五兩研）　朱砂（五兩研）　鬼臼（五兩）　鬼督郵（五兩）
雌黄（五兩研）　馬兜鈴（五兩）　皂莢（五兩炙）　虎骨（五兩炙）
阿魏（五兩）　甲香（一兩）　羚羊角（一枚屑）　桃白皮（五兩）
白膠香（一兩）　菖蒲（五兩）　羖羊角（一枚屑）　臘蜜（八斤鍊）
石硫黄（五兩研）

右十七味擣篩十六味臘蜜和之丸如杏子將往辟温處燒之
殺鬼去惡若大疫家可燒并帶行忌生血物羊肉餳出第三卷
中（與胡洽方七味不同）

延年秘録辟温方

正旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之懸著門戸上又令人帶之出第十卷中

辟温不相染方二首

病源此病皆因歲時不和温涼失節人感乖候之氣而生病則病氣轉相染易乃至滅門延及外人故須預服藥及爲法術以防之出第十卷中

千金斷温疫主温病轉相染著乃至滅門延及外人無收視者赤小豆丸方

赤小豆二兩 鬼臼二兩 鬼箭二兩 丹砂二兩研入

雄黃二兩研入

右五味末之以蜜和如小豆大服一丸可與病人同床傳衣也忌生血物出第九卷中

延年主辟温疫疾惡氣令不相染易豉湯方

豆豉一升 伏龍肝三兩研入 小兒小便三升

右三味用小便煎取一升五合去滓平旦服之令人不著瘴疫天行有瘴之處宜朝朝服出第十卷中

温病噦方四首

病源伏熱在胃令人胷滿胷滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃中虛冷亦令致噦也並出第十卷中

小品茅根湯療温病有熱飲水暴冷噦者方

茅根 葛根各切半升

右二味以水四升煑取二升稍温飲之噦止則停

又療温病熱未除重被暴寒寒毒入胃熱蘊結不散變噦者方

單煑梓皮稍稍飲之佳温病積飲冷冷結胃中熱入胃中變壯熱大噦者服梓皮温噦得止也夫胃中有

熱者病差後足心皮喜剝脫去頭髮禿落是其證也

又茅根橘皮湯療春夏天行寒傷溫病於胃冷變啘方

白茅根切一升　橘皮三兩　桂心二兩　葛根二兩

右四味切以水六升煮取三升分溫服三合數連服之盡復合啘止乃停耳微有熱減桂一兩文仲古今録驗同忌生葱出第六卷中

古今録驗療溫病有熱飲水暴冷啘枇杷葉飲子者方

枇杷葉拭去毛　茅根各半升

右二味切以水四升煮取二升稍稍飲之啘止則停出第三卷中

溫病渴方二首

病源熱氣入腎藏腎藏惡燥熱氣盛則腎燥腎燥則渴引飲也出第十卷中

深師療毒溫病及吐下後有餘熱渴芍藥湯神方

芍藥五分　黃連四分　甘草二分炙　黃芩二兩

桂心二兩　栝樓二分

右六味切以水五升煮取三升分三服一日令盡忌猪肉冷水海藻菘菜生葱等出第十四卷中

古今録驗知母解肌湯療溫熱病頭痛骨肉煩疼口燥心悶者或是夏月天行毒外寒內熱者或已下之餘熱未盡者或熱病自得痢有虛熱煩渴者方

麻黃二兩去節　知母三兩　葛根三兩　石膏三兩碎裹

甘草二兩炙

右五味切以水七升煮取三升分爲三服若已下及自得下虛熱未歇者除麻黃加知母葛根病熱未除因夢泄者可除麻黃加白薇人參各二兩則止忌海藻菘菜小品同出第二卷中

温病發斑方七首

病源夫人冬月觸冒寒毒者至春始發病病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天時温暖人感乖候之氣未即發病至春又被積寒所折毒氣不得泄至夏遇熱其春寒解冬温毒始發出於肌膚斑爛隱疹如錦文也出第十卷中

肘後療温毒發斑大疫難救黑膏方

生地黃半斤切打碎　好豉一升

右二味以猪膏二斤合露之煎五六沸令三分減一絞去滓末雄黃麝香如大豆者內中攪和盡服之毒便從皮中出則愈忌蕪荑出第二卷中

小品葛根橘皮湯療冬温未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬温毒始發出肌中斑爛隱疹如錦文而欬心悶嘔但吐清汁宜服此湯則靜方

葛根二兩　橘皮二兩　杏人二兩去尖皮及兩人　麻黃二兩去節

知母二兩　黃芩二兩　甘草二兩炙

右七味切以水七升煮取三升分温三服嘔悶吐當先定便且消息忌海藻菘菜古今錄驗同大效出第六卷中

刪繁療肺腑藏熱暴氣斑點香豉湯方

香豉一升熬綿裹　葱鬚切四兩　石膏八兩碎裹　梔子人三兩擘

生薑八兩　大青二兩　升麻三兩　芒消三兩

右八味切以水六升煮七味取二升五合去滓然後下芒消分三服出第十卷中

備急療温毒發斑赤斑者五死一生黑斑者十死一生大疫難救黑奴丸方

麻黃三兩去節　大黃二兩　芒消一兩別下　黃芩一兩

釜底墨（一兩研入） 竈尾墨（一兩研入） 屋梁上塵（二兩研入）

右七味擣末用蜜和如彈子大新汲水五合研一丸服之若渴但與水須臾當寒寒訖便汗則解日移五丈不覺更服一丸此療六日以中常大熱口噤名壞病醫所不療服此丸多差胡洽小品同一名水解丸又一方加小麥黑勃一兩名爲麥奴丸范汪文方同

古今録驗黄連橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛隱㾼如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡已自得下痢宜服此方

黄連（四兩去毛） 橘皮（二兩） 杏人（二兩去尖皮云兩） 枳實（二兩炙）

麻黄（二兩去節） 葛根（二兩） 厚朴（一兩炙） 甘草（一兩炙）

右八味切以水八升煑取三升分三服令盡且消息下當先止忌猪肉冷水海藻菘菜等

又漏蘆橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛隱㾼如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡方

漏蘆 橘皮 甘遂 麻黄（去節）

杏人（去皮尖及兩人） 黄芩（各二兩）

右六味切以水九升煑取三升分四服得下爲佳下後餘外證未好除更服葛根橘皮湯方在前小品方忌海藻菘菜等出第三卷中（一方有知母枳實白薇升麻大黄甘草爲十二味）

又發斑瘡方

黄連（三兩去毛切）

右一味以水二升煑取八合頓服之忌猪肉冷水

溫病勞復方四首

病源温病勞復謂病新差津液未復血氣尚虛因勞動早更生於熱熱氣還入經絡復成病也

又凡得温毒病新差脾胃尚虛穀氣未復若食犬猪羊肉并腸血及肥魚久脂膩必大下痢下痢則不可復救又食餅餌炙鱠棗栗諸生果難消物則不能消化停積在於腸胃便脹滿結實大小便不通因更發熱復成病也非但雜食梳頭洗浴諸勞事等皆須慎之並出第十卷中

千金論曰凡熱病新差及大病之後食猪肉及腸血肥魚久膩必大下痢醫所不能療也必至於死若食餅餌粢黍飴餔炙鱠棗栗諸果及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃虛冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也病新差後但得食糜粥寧可少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁雉兔鹿肉不可食猪狗肉也新差後當靜卧慎勿早起勿令人梳頭澡洗非但體勞亦不可多語言用心使意思勞凡此皆令人勞復有人得病已差而未健詣華旉視脉旉曰雖差尚虛未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內則死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死及熱病房室名陰陽易之病皆難療多死古今録驗集驗同

又療重病新差早起勞及飲食多致復欲死方

燒鼈甲末服方寸匕忌莧菜肘後集驗文仲備急同

出第十卷中

深師療温病差愈食復病麻黃散方

麻黃十分去節　大黃十五分炙　附子一分炮　厚朴二分炙

苦參六分 石膏六分碎綿裹 烏頭六分炮

右七味擣篩以酒若米汁和服方寸匕日三夜二服忌猪肉冷水出第十四卷中

古今錄驗療熱病復麻子湯吳正服効方

麻子一升 豉一升綿裹 牡鼠屎二十一枚

右三味以水五升煑取二升半分温三服立愈試之有神驗肘後同

又大黃丸方

大黃一兩蒸之二斗米下 巴豆五十枚去心皮熬 消石三分熬無者以芒消代之

桂心二分 乾薑二分炮

右五味擣篩四味別擣巴豆令如泥合和以蜜更擣二千杵丸如梧子壞一丸湯服之但熱在膈上當吐在膈下當利豫作粥如服他吐下丸法服藥兩食頃不吐下以熱飲動之若不得吐下可更服一丸半能藥壯人可二丸此藥優於他下藥丸故宜大小下多冷粥解之若有瘡綿挺如指蜜和一丸塗挺頭且內瘡中膿出之不差更作温病不得大便服之得下佳宿食不消亦服之飛尸遁尸蹶服半丸日一應須臾止心腹脹滿痛服一丸瘧者依發日宿勿食清晨服一丸丁壯人服二丸得吐下忍飢過發時乃食婦人產後血結中奔走起上下或絕產無子或月經不調面目青黃服半丸小兒淋瀝寒熱臚脹大腹不欲食食不生肌三四歲如麻子服一丸日一六七歲兒服二丸比三十日心腹諸病差兒小半之愈大良忌野猪肉蘆笋生葱出第三卷中

諸黃方一十三首

病源黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後結熱在裏有血當下去之如㹠肝狀其人小腹滿急若其人眼睛澀疼鼻骨

痰兩膊及項強腰背急則是患黃大便澀但令得小便快則不慮死不用大便多多則心腹脹不好此由寒濕在表則熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏鬱蒸不得消則大小便不通故身體面目皆變黃色凡黃候其寸口近掌無脉口鼻氣冷並不可療之必死出第十二卷中

仲景傷寒論諸黃猪膏髮煎主之方

猪膏八兩　亂髮大如雞子二枚

右二味內髮膏中煎之髮消盡研絞去膏細滓分二服病從小便去也出第十四卷中附後備急文仲千金古今錄驗深師范汪同云大醫校尉史脫家婢再病胃中乾糞下便差神驗

刪繁療天行毒熱通貫藏腑沈鼓骨髓之間或爲黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等疾喘息須臾而絕瓜蔕散方

瓜蔕二七枚　赤小豆二七枚　秫米二七粒

右三味擣篩爲散取如大豆粒吹於兩鼻之中甚良不差間日復服之千金范汪集驗同

又方

瓜蔕二七枚

右一味以水一升煮取五合一服之

又方

鹽一升

右一味紙裹漬濕燒之取通赤內三升水中攪令調手巾攊度爲一服已前二方服訖並吐出黃汁

崔氏療黃貧家無藥者可依此方

取柳枝三大升以水一斗煮取濃汁弱半升一服令盡

又療黃兼主心腹方

蔓菁子一大合簸揀使令淨

右一味擣碎熟研以水一升更和研濾取汁可得一大盞頓服之少頃自當轉利或亦自吐腹中便寬亦或得汗便愈備急文仲深師同並出第一卷中

延年秘錄療黄瓜蔕湯方

瓜蔕二兩 赤小豆四十九枚 丁香二七枚

右三味擣末以水一升煮取四合澄清分爲兩度滴入兩鼻中出第十卷中

救急療三十六種黄方

取雞子一顆并殼燒作灰研破酢一合又温之總和頓服身體眼暗極黄者不過三顆鼻中蟲出神効

又療諸黄闇黄眼闇及大角赤黒黄先擲手足内黄患渇疸黄眼赤黄腎黄小便不通氣急心悶五色黄瓜蔕散方

丁香 瓜蔕 赤小豆各十枚

右三味細擣篩取煖水一雞子許和服大神驗並出第十七卷中廣濟同

必効療一切黄蔣九處得其父遠使得黄服此極効茵蔯湯及丸方

茵蔯四兩 大黄三兩 黄芩三兩 梔子三兩擘

右四味切以水五升煮取三升分爲三服空肚服之不然下篩蜜和爲丸飲服二十丸稍稍加至二十五丸日二三量病與之重者作湯勝服丸日一服忌羊肉酒麪熱物等以差爲限

小便黄色及身黄者並主之

又療諸黄眼已黄亦差瓜蔕散方

丁香一分 赤小豆一分 瓜蔕一分 一方加秫米一分

右三味擣末温水食前頓服使盡則當利并吐黄水不差更服並出第一卷中

千金療黃疸大黃丸方

大黃二兩 葶藶三兩

右二味擣篩爲末蜜和爲丸如梧子大未食服十丸日三服病

差便止

又大黃丸方

大黃二兩 黃連三兩 黃芩 黃蘗各一兩

麴衣五合

右五味擣篩爲末蜜和丸如梧子大食前服三丸日三服不

知可至五丸忌猪肉冷水並出第十卷中

急黃方六首

病源脾胃有熱穀氣鬱蒸因爲熱毒所加故卒然發黃心滿

氣喘命在頃刻故云急黃也有得病即身體面目發黃者有初

不知是黃死後乃身面黃者其候得病但發熱心戰者是急黃

也並出第十二卷中

廣濟療急黃身如金色瓜蔕散方

赤小豆二七枚 丁香二七枚 黍米二七粒 瓜蔕二七枚

麝香 薰陸香等分別研入 青布二方寸燒爲灰

右七味擣篩爲散飲服一錢匕則下黃水其黃則定忌生冷

熱麪粘食陳臭等出第一卷中一方止三味

必効療急黃疸内黃等大黃湯方

大黃三兩麤切 芒消二兩

右二味以水二升生漬大黃一宿平旦絞汁一升半内芒消攪

服須臾當快利差出第一卷中

延年秘録療急黃心下堅硬渴欲得水喫氣息喘麤眼黃但

有一候相當則須宜服此瓜蔕散吐則差方

瓜蔕二小合熬 赤小豆二小合

右二味擣篩爲散年大人煖漿水五小合和散一服滿一方寸匕一炊久當吐不吐更服五分匕水亦減之若輕病直吹鼻中兩黒豆粒大亦得當鼻中黄水出即歇并宜灸心厭骨下一寸名巨闕灸五七炷以來初小作炷在後漸大仍不得大於梧子

吐訖及灸了訖即渴仍服麥門冬飲子方

麥門冬四兩去心　栝樓三兩　竹葉一升　茯苓四兩

升麻二兩　生蘆根一升　甘草一兩炙

右七味切以水七升煎取二升五合絞去滓分温三服服別相去如人行八九里久服此飲渴即止出第十卷中忌肉麪果子生冷酢物海藻菘菜等

千金療急黄熱氣骨蒸兩目赤脉地黄汁湯方

生地黄汁八合　大黄六分末　芒消一兩

右三味合和一服五合日二服以利爲度忌蕪荑

近効療急黄方

取蔓菁子油一盞頓服之臨時無油則以蔓菁子擣取汁水和之喫亦得候顔色黄或精神急則是此病韋給事試用之有効忌蕪荑

黄疸方十三首

病源黄疸之病此由酒食過度藏腑不和水穀相并積於脾胃復爲風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故食已如飢令身體面目爪甲及小便盡黄而欲安卧若身脉多赤多黒多青皆見者必寒熱身痛面色微黄齒垢黄爪甲上黄此黄疸也疸而渴者其病難療疸而不渴者其病可療發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱出第十二卷中

仲景傷寒論黄癉麻黄醇酒湯主之方

麻黃二大把去節綿裹

右一味美清酒五升煮取二升半去滓頓服盡古今方云傷寒熱出表發黃疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良小品古今録驗張文仲經心録同

又黃疸茵蔯蒿五苓散主之方

茵蔯蒿末十分　五苓散五分

右二味和先食白飲和方寸匕服之日三忌大酢桃李雀肉生葱深師范汪同

又五苓散利小便治黃疸方

猪苓三分去皮　白朮三分　茯苓三分　澤瀉五分

桂心二分

右五味擣篩和合白飲和服一方寸匕日三多飲煖水以助藥勢汗出便愈並出第十四卷中忌大酢生葱桃李雀肉等千金深師范汪同

崔

肘後療黃疸方

燒亂髮服一方寸匕日三秘驗酒飲並得備急文仲同出第一卷中

范汪療黃疸散方

取瓠子白瓤及子熬令黃擣爲末服半錢匕日一服十日愈用瓠子數數有吐者當先詳之出第三十四卷中

集驗療黃疸百藥不差者方

驢頭一枚煮熟以薑虀噉之并隨多少飲汁出第二卷中千金備急崔氏張文仲古今録驗同

千金療黃疸方

取生小麥苗擣絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四

日便愈無小麥苗穬麥苗亦得范汪云用小麥勝也

備急文仲集驗並同出第十卷中

千金翼療黃疸目黃不除瓜丁散方

瓜丁細末如大豆許內鼻中令病人深吸取入鼻中

黃汁出

又黃蒸湯方

黃蒸一升 麥䴸一升 猪屎一升

右三味以水五升漬一宿煑取三升絞去滓頓服一升覆取

汗必効同出第十八卷中

崔氏療黃疸年六十以上方

茅根一把細切 猪肉一斤

右二味合作羹盡一服愈當灸臍上下兩邊各一寸半一百

壯手魚際白肉側各一炙隨年壯備急范汪同

又療黃疸方

苦胡盧瓤如大棗許

右一物以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許汁分

內兩鼻孔中餘節候與上方同比來常用乃勝瓜蔕散

近効療黃疸苽蔕散方

瓜蔕二七枚 赤小豆二七枚 生秫米二七枚 丁香二七枚

右四味擣篩重者取如大豆二枚各著一枚鼻孔中痛縮鼻

須臾鼻中瀝清黃水或從口中出升餘則愈病輕者如一小

豆則可一與不盡間日復頻用効李暠用之立驗俗人或使人

以竹筒極力吹鼻中無不死者愼之

又療男子女人黃疸病醫療不愈身目悉黃食飲不消胃中脹

熱生黃衣在胃中有乾屎使病爾方

以成煎猪脂一小升温熱頓盡服之日三燥屎下去乃

愈備急崔氏同

黃疸遍身方一十一首

廣濟療黃疸遍身面悉黃小便如濃梔子汁茵蔯丸方

茵蔯（四兩） 黃芩（三兩） 枳實（二兩炙） 大黃（三兩）

右四味擣篩蜜丸空腹以米飲服如梧子二十丸日二服漸加至二十五丸微利爲度忌熱麪蒜蕎麥粘食陳臭物出第一卷中（一方有升麻三兩）

肘後療黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱外以冷迫之熱因留胃中生黃衣熱薫上所致方

猪脂一升

右一味成煎者温令熱盡服之日三燥屎當下下則稍愈便止備急崔氏同出第三卷中（與前近効方同）

小品療黃疸身目皆黃皮膚麴塵出三物茵蔯蒿湯方

茵蔯蒿（一把） 梔子（二十四枚擘） 石膏（一斤完者） 千金方加大黃（三兩）

右三味以水八升煑取二升半去滓以猛火燒石膏令正赤投湯中沸定取清汁適寒温服一升自覆令汗出周身遍以温粉粉之則愈若不汗更服一升汗出乃愈也深師古今録驗千金翼同出第四卷中

集驗療黃疸身體面目皆黃大黃散方

大黃（四兩） 黃連（四兩） 黃芩（四兩）

右三味擣篩爲散先食服方寸匕日三服亦可爲丸服備急文仲千金同忌猪肉冷水出第二卷中

刪繁療黃疸者通身並黃茵蔯湯方

茵蔯（四兩） 柴胡（四兩） 升麻（三兩） 龍膽（二兩）

黃芩 大黃（各三兩）

右六味切以水九升煑取三升分三服古今録驗千金同若

身體羸去大黃加梔子人五六兩生地黃切一升出第十卷中

千金翼論曰凡遇天行熱病多必內瘀著黃但用瓜丁散內鼻中令黃汁出乃愈即於後不復恐病黃矣常須用心警候病人四肢身面微似有黃氣則須用瓜丁散不得令散漫失候必大危矣特忌酒麪犯者死

又凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃麴塵出小便赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯餘熱不除久黃者苦參散方

苦參一兩　黃連一兩　葶藶子熬　瓜蔕

黃芩　黃蘗　大黃各一兩

右七味擣爲散飲服方寸匕當大吐者日一服不吐日二亦得下服藥五日知可消息不知更服忌猪肉冷水古今錄驗千金小品同出第十八卷中

崔氏療黃疸身體面目盡黃茵蔯湯太醫校尉史脫方

茵蔯蒿三兩　黃連二兩　黃芩三兩　梔子十四枚擘

大黃一兩　甘草一兩炙　人參一兩

右七味切以水一斗煑取三升分三服千金同忌猪肉冷水海藻菘菜出第一卷中

延年祕錄梔子湯療遍身黃如橘心肋滿急方

梔子人四兩　黃芩三兩　柴胡四兩　升麻三兩

龍膽二兩　大黃三兩　栝樓三兩　芒消二兩

右八味切以水九升煑取二升八合去滓分溫三服相去四五里進一服出第十卷中

必效黃疸身眼皆如金色但諸黃皆主之方

取東引桃根細切如筯若釵股以下者一握取時勿令見風及婦人并雞犬等見之以水一大升煎取弱一小升適寒溫空腹頓服服後三五日其黃離離如

薄雲散唯眼最後差百日方平復身黃散後可時
時飲一盞清酒則眼中易散不則散遲忌食豬魚
等肉此方是徐之才家祕方其姪珍惠說密用出第
一卷中

近效療發黃身面眼悉黃如金色小便濃如煑黃蘗汁者衆醫
不能療良驗茵蔯湯方

茵蔯四兩　黃芩二兩　梔子三兩　升麻三兩
大黃三兩　龍膽二兩　枳實二兩炙　柴胡四兩

右八味切以水八升煑取二升七合分溫三服若身絕羸加
生地黃一升梔子加至七兩去大黃如氣力不羸猶下者依
前著大黃取驗忌如藥佉不差更作以差爲限不過三四
劑差隔三五日一劑經心錄同李暠處得此方神良

癊黃方三首

病源陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱
名爲癊黃也出第十二卷中

廣濟療癊黃身面眼俱黃小便如豉汁色茵蔯散方

茵蔯四兩　白鮮皮三分　栝樓四分　黃芩三分
梔子四分　芍藥三分　青木香三分　柴胡三分
枳實三分炙　黃連三分　紫雪八分　土瓜根三分
大青三分　大黃十分

右十四味擣篩爲散煑茅根飲待冷平旦空腹以茅根飲服
五錢匕一服少間當一兩行微利利後煑稀葱豉粥食之利
多以意漸減常取微溏利通一兩行爲度差止忌豬肉冷水
魚蒜粘膩及諸熱食出第一卷中

必效療癊黃眼睛黃汙染衣涕唾黃方

好黃蒸二大升

右一味每夜以水二大升浸微煖令熱勿令沸銅器中平旦絞取汁半升飲之餘汁須飲則飲冬日微煖服夏冷飲每夜則浸依前服之亦得每夜小便中浸帛片取色退爲驗兩方並極効忌麪羊肉猪魚

又療癊黃汗染衣涕唾黃者方

取蔓菁子擣細羅平旦以井花水和一大匙服之日再漸加至兩匙以知爲度每夜小便裏浸少許帛各書記日色漸退白則差不過服五升以來必差李潤州傳極効備急肘後張文仲深師同出第一卷中

黃疸小便不利及腹滿喘方二首

仲景傷寒論黃家腹滿小便不利而赤身汗出者表和裏實也宜下之大黃黃蘗皮梔子消石湯方

大黃四分　黃蘗四兩　肥梔子十五枚擘　消石四兩末

右四味切以水六升煮三物得二升半去滓內消石更煎取一升先食頓服盡小品千金翼深師范汪並同

又黃疸小便色不變欲自利腹滿而喘者不可除其熱熱除必噦噦者小半夏湯主之方

半夏五兩洗之　生薑八兩切

右二味以水六升煮取一升半去滓分溫三服忌羊肉餳並出第十四卷中范汪同

黃汗方三首

病源黃汗之爲病身體洪腫發熱汗出而渴狀如風水汗染衣者色正黃如蘗汁其脉自沈此由脾胃有熱汗出而入水中若浴水入汗孔得之出第十二卷中

仲景傷寒論師曰黃汗爲病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣者色正黃如蘗汁脉自沈也問曰從何得之師曰以汗

出水入汗孔水從外入而得之宜黃耆芍藥桂心苦酒湯主之方

黃耆五兩　芍藥三兩　桂心三兩

右三味切以苦酒一升水七升和煑取三升去滓温服一升正當心煩也至六七日稍稍自除其心煩不止者以苦酒咀故也咀一作阻一方用美清醯代酒忌生葱備急張文仲千金古今錄驗深師范汪經心錄同

又凡黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已則汗出又身常夜卧盜汗出者此勞氣也若汗出即發熱者久久身必甲錯也發熱不止者必生惡瘡也若身重汗出已輒輕者久久必身瞤瞤則胷中痛又從腰以上必汗出下無汗腰寬弛痛如蟲在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利者名曰黃汗桂枝湯加黃耆五兩主之方

桂心三兩　芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑三兩

大棗十二枚擘　黃耆五兩去皮

右六味切以水八升微火煎取三升去滓温服一升覆取微汗須臾間不汗者食稀熱粥一升餘以助湯力若不汗者更服湯也忌海藻菘菜生葱古今錄驗范汪同出第十四卷中

療黃疸身腫發熱汗出而渴狀如風水汗出著衣皆黃黃汗吴藍湯方

吴藍六分　芍藥　麥門冬去心　桑白皮

漢防已　白鮮皮　山梔子各六分

右七味各細切以水二升煎取八合去滓空腹分二服未効再合服此方未詳所出

女勞疸方四首

病源女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒少腹滿急小便難由大勞大熱而房室房室畢入水所致也出第十二卷中

仲景傷寒論黃家日晡發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱因作黑癉大便必黑腹臚脹滿如水狀大便黑溏者此女勞之病非水也腹滿者難療消石礬石散主之方

消石熬黃　礬石燒令汁盡

右二味等分擣絹篩以大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取汗病隨大小便去小便正黃大便正黑也大麥則須是無皮麥者千金方云消石二分熬令燥礬石一分熬令燥故注之

肘後小品崔氏文仲千金范汪深師並同出第十四卷中

千金翼療黃疸之爲病日晡所發熱惡寒小腹急體黃額黑大便黑溏泄足下熱此爲女勞也腹滿者難療方

滑石五兩碎研　石膏五兩研

右二味爲散以大麥粥汁服方寸匕日三小便極利則差出第十八卷中小品千金備急文仲並同

近効女勞疸黃家日晡發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱因作黑疸其大便必黑腹臚脹滿如水狀大便黑溏此女勞之病非水也療與黑疸同穀疸食則眩心忪怫鬱不安久久發黃爲穀疸並以前茵蔯湯至之方在遍身黃部中

必効女勞之黃氣短聲沈者宜服此方

取婦女月經和血衣燒作灰以酒空腹服方寸匕日再服不過三日必差

黑疸方三首

病源黑疸之狀苦小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是也夫黃疸酒疸女勞疸久久變成黑疸出第十二卷中

肘後療黃疸變成黑疸者多死急治之方

取土瓜根汁服一小升平旦服至食時病從小便去
則愈不忌先須量病兒氣力不得多服力羸則起
不得千金并翼文仲集驗崔氏刪繁范汪並同第
一卷中

深師療黑疸身體及大便正黑赤小豆茯苓湯方

赤小豆三十枚 茯苓六銖 瓜蔕四銖 雄黃二銖
甘草半兩炙 女萎四銖

右六味切以水三升煮小豆茯苓取八合汁擣後四藥爲散
取前汁調半錢匕適寒溫服之須臾當吐吐則愈一方云療
久黃疸忌大醋海藻菘菜千金翼同出第二十卷中千金翼名赤靈散

千金翼茵蔯丸主黑疸身體闇黑小便澀體重方

茯苓四分 茵蔯一兩 枳實五分炙令黃 白朮五分亦如枳實法
半夏三兩洗 甘遂一分 杏人三分去尖皮 椒二升汗
當歸二分 葶藶子四分熬 乾薑四分 大黃三分熬勿令焦

右十二味擣篩蜜和丸如梧子空肚飲服三丸日三服忌羊
肉餳酢桃李雀肉等出第十八卷中

酒疸方十首

病源夫虛勞之人若飲酒多進穀少者則胃內生熱因大醉當
風入水則身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑若下
之久久變爲黑疸目青面黑心中如噉蒜虀狀大便正黑皮膚
抓之不仁其脉浮弱故知之酒疸心中熱欲嘔者當吐之即愈
小便不利其候當心中熱足下熱是其證明也若腹滿欲吐鼻
躁其脉浮者先吐之沈弦者先下之出第十二卷中

仲景傷寒論酒癉者心中懊憹或熱痛梔子枳實豉大黃湯
主之方

梔子七枚擘 枳實五枚破水漬炙 香豉一升綿裹 大黃一兩

右四味切以水六升煮取二升去滓温服七合日三服出第十四卷中肘後千金同

肘後療酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃飲酒面發赤斑黃黒由大醉當風入水所致黃耆散方

黃耆二兩 木蘭皮一兩

右二味爲散酒服方寸匕日三備急文仲同

深師酒疸艾湯方

生艾葉一把無生用乾者半把 麻黃二兩去節 大黃六分 大豆一升

右四味切清酒五升煮取二升分爲三服出第三十卷中

千金茵蔯湯主黃疸酒疸酒癖身體面目盡黃方太醫校尉史脫處

茵蔯三兩 大黃二兩一方一兩 梔子二七枚擘 黃芩三兩一方用一兩

人參半兩一方用一兩 黃連二兩一方用一兩 甘草一兩炙

右七味切以水一斗煮取三升分爲三服忌猪肉冷水海藻菘菜文仲范汪同

又夫人病疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐酒疸心中熱欲嘔吐之即愈方

取千金翼苦參散吐良在上遍身黃部中七味者是也

又肉疸飲少小便多白如泔色得之從酒寒水石散方

寒水石五分 白石脂五分 栝樓五分 菟絲子三分酒漬

知母三分 桂心三分

右六味擣篩麥粥服五分匕日三服五日知忌生葱古今錄驗深師等並同

古今錄驗療酒癖及飲黃疸散方

芫花 椒目各等分

右二味擣下篩爲散平旦服一錢匕老少半服之藥攻兩脅

則下便愈間一日復服使小減相前人與之使盡根源出第二十七卷中深師同

穀疸方三首

病源穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝熏所致陽明病脉遲食難用飽飽則發煩頭眩者必小便難此欲爲穀疸雖下之其腹必滿以其脉遲故也出第十二卷中

范汪療穀疸茵蔯湯方

茵蔯四兩切以水一斗煮取六升以汁煎大黃二兩梔子七枚得二升分爲三服黃從小便去病出立愈出第十四卷中肘後同

集驗療勞疸穀疸丸方

苦參三兩　龍膽一兩

右二味下篩牛膽和丸先食以麥粥飲服如梧子大五丸日三不知稍增出第二卷中千金同

删繁療勞疸穀疸苦參丸方勞疸者因勞爲名也穀疸者因食而勞故日穀疸

苦參三兩　龍膽二兩　梔子人三七枚

右三味擣篩爲散若病甚取猪膽和爲丸如梧子大一服五丸日三四服以飲汁下之

許仁則療諸黃方七首

許仁則療急黃病此病始得與前天行病不多異五六日但加身體黃甚者洟音夷鼻液也下同淚汗唾小便如蘗色眼白睛正黃其更重狀與天行病候最重者無別如至此困自須依前救天行最重平夏等分七味湯救之若未至是者宜依後法急黃狀始得大類天行病經三兩日宜合麻黃等五味湯服之發汗以洩黃勢方

麻黃三兩去節　乾葛五兩　石膏八兩研裹　生薑六兩
茵蔯二兩

右藥切以水八升煮取二升七合去滓分温三服服相去十里久服訖當欲汗則覆被微取汗以散之

又依前麻黃等五味湯服之取汗汗出後未歇經三五日又合梔子等五味湯以取利方

梔子二十枚擘　柴胡三兩　黃芩三兩　茵蔯三兩
芒消六兩

右藥切以水八升煮四味取二升六合去滓内芒消攪令消分温三服如人行十里久更服之効

又依前梔子等五味湯服之取利利後病勢不歇經六七日又合秦艽牛乳二味湯服之方

秦艽六兩　牛乳二升

右藥切秦艽以牛乳煑之可三分減一去滓帶煖頓服令盡極驗文仲必効同西域法也

又依前秦艽等二味湯藥服後不覺病退漸加困篤勢如前天行最重狀則不可更服諸冷物冷物在心唯是痞速宜同前天行用半夏等十味湯以救之亦可合瓜蔕等三味散吹鼻孔中并與之服方

瓜蔕七枚　丁香七枚　赤小豆七枚

右藥擣篩末取如大豆分吹兩鼻孔中須臾當出黃水正如煑蘗汁及出黃蟲亦可以新汲水和一方寸匕與患人服或利或吐吐利所出亦如煑黃蘗汁天行用此療亦與崔氏同

又論云此病俗間亦有單煑瓜蔕汁灌鼻孔中者亦有單服生麻油者

又療黃疸病此病與前急黃不同自外狀與平常無別但舉體

正黃甚者眼色如蘗涕涎洟小便及汗悉如蘗汁食消多於尋
常稍覺瘦悴乏力此病不甚殺人亦有經年累歲不療而差者
此由飲酒多亦是積虛熱所致黃疸初得稍覺心中煩熱滿身
黃色眼白睛黃覺如此者宜合白鮮皮等七味湯以洩之黃連
十味丸以壓之

白鮮皮三兩 乾葛五兩 黃芩三兩 鬱金三兩
豉五兩綿裹 梔子十枚擘 芒消六兩

右藥切以水八升煮取二升半去滓內芒消分溫三服服相
去如人行二十里久更服此湯當得利利後將息一二日則
合後黃連等十味丸服之

又黃連丸方

黃連五兩 黃芩五兩 苦參六兩 沙參五兩
乾地黃六兩 乾葛六兩 梔子人三兩 麥門冬一升去心
地骨白皮五兩 茯苓五兩

右十味擣篩爲末蜜和爲丸以米飲下初服十丸日三服稍
稍加至三十丸如梧子大黃疸亦有單服豬脂得差者忌豬
肉冷水大酢蕪荑等物吳昇同

雜黃疸方三首

千金濕疸之爲病始得之一身盡疼發熱面色黃黑七八日後
壯熱熱在裏有血當下去之如豚肝狀其小腹滿者急下之亦
一身盡黃目黃腹滿小便不利礬石散方

礬石五兩 滑石五兩

右二味爲散大麥粥汁服方寸匕日三服當先食服便利
如血者當汗出差出第十卷中深師古今錄驗並同

古今錄驗九疸秦王散方

胃癉食多喜飲梔子人主之

心痺煩心心中熱葛根主之

腎痺其人脣乾葶藶子熬主之

脾痺溺赤出少惕惕若恐栝樓主之

肺痺飲少小便多秦椒汗瓜蔕主之一云膏痺

舌痺渴而數便石鍾乳主之

肉痺其人小便白凝水石主之研入

髓痺目眶深多嗜卧牡蠣澤瀉主之

肝痺胃熱飲多水激肝白朮主之

右十一味名秦王散各等分隨病所在加二分擣合下篩飲服五分匕日三稍加可至方寸匕忌桃李雀肉等

膏痺飲少小便多秦椒散方

秦椒一分汗　瓜蔕二分

右二味擣下篩水服方寸匕日三服出第二十七卷中深師千金同

外臺秘要方卷第四

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　子孟　校勘